



Hutton®

FORTE

NOVÝ FUNGICID INSPIROVANÝ PRAXÍ

- ✓ nové složení pro efektivnější ošetření
- ✓ pro všechny oblasti pěstování obilnin
- ✓ bez omezení v OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod

PROFIL PŘÍPRAVKU

Složení (FRAC skupina)

prothioconazole 93,3 g/l (3/G1)
spiroxamine 107 g/l (5/G2)
trifloxystrobin 80 g/l (11/C3)

Formulace

EC - emulgovatelný koncentrát

Plodiny (termín aplikace)

ječmen (BBCH 30–61), pšenice (BBCH 30–69)
žito (BBCH 30–69), tritikale (BBCH 30–69)

Dávkování

1,3–1,5 l/ha (200–400 l/ha vody)

Spektrum účinnosti

listové a klasové choroby obilnin

Počet aplikací v plodině

maximálně 2x (interval 21 dnů)

Ochranná lhůta

AT (dána odstupem aplikace a sklizně)

Odstup srážek od aplikace

1 hodina (po zaschnutí na listech)



Balení

kanystr 5 l

FLEXIBILNÍ POUŽITÍ A TERMÍN APLIKACE


Hutton® Forte lze aplikovat v širokém intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení, v jčmení do začátku kvetení. Fungicid je určen pro ochranu listových pater, praporcevého listu, popřípadě současně i klasu (termín T2). Při výskytu raných infekcí padlí a listových chorob je možné použít v termínu T1. Při aplikaci v pozdější růstové fázi (termín T3) velmi dobře působí proti klasovému fužarím. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení je doporučeno používat dávku 1,5 l/ha. V případě nižšího výskytu a tlaku chorob nebo ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 1,3 l/ha.

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI



OŠETŘENÍ PODLE INTENZITY PĚSTOVÁNÍ

PŠENICE OZIMÁ



JEČMEN JARNÍ

